

FORMIFIM[®]

GEL FORMICIDA



UM PRODUTO
ChemoNE

**Altamente Atrativo
Efeito Dominó**

Coloração Ideal



ChemoNE
INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.

**Quem faz o melhor,
faz a diferença !**

FICHA TÉCNICA

FORMIFIM[®] GEL FORMICIDA

CLASSE

Inseticida

GRUPO QUÍMICO

Neonicotinóides

INGREDIENTE ATIVO

Imidacloprid

NOME QUÍMICO

1-(6-chloro-3pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

FÓRMULA MOLECULAR

C₉ H₁₀ ClN₅ O₂

COMPOSIÇÃO

Imidacloprid a 0,15% p/p, Benzoato de Denatonium, solvente e atrativos.

MECANISMO DE AÇÃO

Por contato e ingestão, age diretamente no sistema nervoso central do inseto, provocando paralisia e morte.

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO

DL50 Oral: >2000 mg/kg
DL50 Dermal Aguda: > 2000 mg/kg
Irritabilidade Dérmica: Não irritante
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante

INDICAÇÃO DE USO

FORMIFIM[®] gel-inseticida indicado para o controle de formigas docesiras.

MODO DE USAR

FORMIFIM[®] gel vem pronto para o uso em seringas contendo 30 g. Para aplicar basta pressionar o êmbolo lentamente, depositando pequenos filetes de 2 a 5 cm do gel, nos pontos mais acessíveis às formigas. Dosagem: 0.05 g/m².

PONTOS DE APLICAÇÃO - Aplique o produto nos locais onde as formigas costumam aparecer, como cozinhas, banheiros, porões, despensas, garagens, etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo e atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro e embaixo de armários e outros móveis, etc.

Obs: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

AÇÃO TÓXICA

Agonista da Acetilcolina

ANTÍDOTOS / TRATAMENTO

Anti-histaminico e tratamento sintomático

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. "CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar. Não fumar ou comer durante a aplicação. Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais. A limpeza de eventuais resíduos deveser feita com uso de luvas, colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final adequada, assim como as embalagens vazias. Observar a legislação estadual e municipal específicas. Recomenda-se o uso de luvas no manuseio e aplicação das iscas inseticidas. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, e em local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 seringa plástica de 30 g
Caixa de Despacho com 36 cartuchos.

Telefone de emergência: CEATOX: 0800 722.6001

ANTES DE USAR O FORMIFIM[®] GEL, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA



UM PRODUTO
ChemoNE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Cecília D. de Medeiros-CRQ/PE nº 01300324 -1ª Região
REGISTRADO NO MS SOB O Nº 3.2398.0002.001-9

Fabricado por: CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA. - Rod. BR 232 km 104-Lote 14
Quadra A-nº 350 - Distrito Industrial - Bezerros - PE - Brasil - Cep.: 55.660-000-C.N.P.J.: 03.251.289/0001-00
Tel.: (81) 3117-1000 - Fax: (81) 3117-1014 - Indústria Brasileira

Visite o nosso site:

www.chemone.com.br