

Ficha Técnica D'FIM GEL FORMICIDA

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: D'FIM GEL FORMICIDA

Nome Comum: Fipronil

Categoria: Gel

Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0051

Composição química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

COMPOSIÇÃO:

Fipronil 0,05% p/p, atrativo, Desnaturante, Antioxidante, Conservante e Veículo

INDICAÇÕES DE USO:

Formicida D'FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo contra as formigas (*Tapinoma melanocephalum*), mais conhecidas como formigas fantasmas.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem/ Área g/ m ²
Formigas	0,05

Aplicar D'FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas. Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

RECOMENDAÇÃO:

Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.

PRECAUÇÕES:

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Utilizar luvas durante a aplicação.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Não reutilizar a embalagem vazia, tanto a caixa de papelão como a seringa plástica. Após o uso, proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO: Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado, temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRCQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico / Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018