

## Ficha Técnica ATTAMIX 400P

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



**Nome Comercial:** Formicida Pó ATTAMIX 400P

**Nome Comum:** Deltametrina

**Categoria:** Formicida e Cupinicida pó

**Registro Ministério da Saúde:**

M.S.3.2781.0003

**Composição química:** (S)-\_ciano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

### ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

-Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

### ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan  
CRQ: 04217828 – IV Região

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** Piretróide

**Nome Comum:** Deltametrina

**Antídoto/Tratamento:** Anti-histamínico / Tratamento Sintomático

**Telefone de Emergência:** (16) 3663-1000

**Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP:** 0800-148110

### FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018

### COMPOSIÇÃO:

Deltametrina .....0,2% p/p

Inertes(Veículo).....100% p/p

### INDICAÇÕES DE USO:

Formicida pó Attamix é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e cupins (*Nasititermes sp.*) nos campos.

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

Praga	Dosagem / Áreas g /m <sup>2</sup>
Cupins	30
Formigas	30

Aplicar Formicida pó Attamix diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas, na dosagem de 30g/m<sup>2</sup>.

### RECOMENDAÇÕES:

- Não aplique em humanos e animais.
- Isolar o local a ser tratado visando evitar o acesso a crianças e animais domésticos.
- Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando o desperdício e possibilidade de depósito desnecessário de resíduos.
- Não aplicar em dias chuvosos ou em solo úmido.
- Quando aplicado nos locais onde ficam os animais domésticos, aguardar o efeito desejado, promover a higienização do local através da remoção dos resíduos do produto com água e sabão para só então proceder com a reentrada dos animais.

### PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.

### PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.